

# التواصلات البيخلوية

يتكون الجسم من أعضاء ، كل عضو متخصص في وظيفة معينة ، يعمل بنظام معين ، لكي يحافظ الجسم على توازنه لا بد من التنسيق و التواصل بين مختلف أعضائه ، هذا التواصل يوظف آليتين دقيقتين ، يمثلهما التواصل الهرموني و التواصل العصبي ، و في بعض الوظائف يتم الدمج بين النوعين فيصبح التواصل عصبي هرموني.

فكيف يتم التواصل الهرموني ؟  
كيف يتم التواصل العصبي ؟  
و كيف يتم الاندماج العصبي الهرموني ؟

# التواصل الهرموني

للتعرف على آلية التواصل الهرموني ، ندرس كمثال آلية تنظيم تحلون الدم

## 1- تعريف تحلون الدم *glycémie*:


يسمى تحلون الدم نسبة الغليكوز في الدم ، و تقدر عند الشخص السليم و الصائم منذ عدة ساعات بحوالي  $1 \text{ g / l}$  . و يمكن قياسه باستعمال جهاز قياس تحلون الدم

## 2- الكشف عن وجود تنظيم لتحلون الدم :

أ- تجربة :

يقوم شخص صائم منذ عدة ساعات بتناول  $75 \text{ g}$  من الغليكوز ثم نتبع تطور تحلون دمه .

ب- نتيجة :




قبل تناول الغليكوز تحلون الدم يساوي  $0.9 \text{ g / l}$

يؤدي تناول المحلول إلى ارتفاع تحلون الدم

بعد ذلك ينخفض تحلون الدم تدريجيا ليعود إلى قيمته الأصلية بعد حوالي 5 ساعات .

بعد كل وجبة يرتفع تحلون الدم ثم يعود إلى أصله :



ت- استنتاج :


تدل عودة تحلون الدم إلى قيمته الأصلية على وجود آلية منظمة لتحلون الدم في الجسم تعيده بعد كل ارتفاع أو انخفاض إلى قيمته الطبيعية .

3- أين يختفي الغليكوز في الجسم؟

أ- تجربة :

لمعرفة الأعضاء التي يختفي عند مستوياتها الغليكوز في الجسم ، نحقن حيوانا بمحلول غليكوز مشع ب  $C^{14}$  ثم نتبع مصير الإشعاع في جسم الحيوان .

ب- نتيجة :



يصل الغليكوز إلى أعضاء مختلفة من الجسم أهمها الكبد العضلات و الدماغ ، إلا أنه تستعمل في أغلبها و لا يخزن بأعلى نسبة إلا في الكبد

ت-استنتاج :


الغليكوز المختفي نتيجة تنظيم تحلون الدم لا يضيع و إنما تستعمله الأعضاء أو تخزنه ، و يعتبر الكبد أكبر متلقي للغليكوز و أكبر خازن له .

#### 4- كيف يحتفظ الكبد بالغليكوز؟ :

يرجع المذاق الحلو للكبد إلى غناه بسكر مركب يسمى الغليكوجين (  $C_6H_{10}O_5$  )<sub>n</sub>

#### أ- أعمال Claude Bernard

أطعم كلبا سليما بأغذية غنية بالسكريات ، ثم ضحى به و عزل كبده رفقة وريدها البابي و الفوق كبدي ثم حقن عبر الوريد البابي الماء المقطر الذي يعبر الكبد و يخرج عبر الوريد الفوق كبدي ، عند خروجه يقيس نسبة الغليكوز به، تسمى هذه التجربة بالكبد المغسول ، و بالموازاة مع ذلك يقيس نسبة الغليكوجين في الكبد .



ب-نتيجة :

120	90	70	60	40	20	10	5	0	الزمن ب mn
0	آثار	آثار	+	+	+	+	+	0	نسبة الغليكوز في الماء الخارج من الكبد
0	+	+	+	+	+	++	++	+++	نسبة الغليكوجين في الكبد

ت-استنتاج :

يحتفظ الكبد بالغليكوز في خلاياه على شكل غليكوجين ، بحكم موقعه في الجسم يستقبل الكبد الدم الآتي من الأمعاء الدقيقة محملا بالقيت و يتحلون مرتفع ، فيساهم في تنظيم تحلون الدم ، ليخرج الدم منه بالتحلون الطبيعي :

تحلون الدم (g. L <sup>-1</sup> )		
في الوريد فوق الكبدي	في الوريد البابي	
0,95	0,8	بعد صوم
إلى 1,05		لبضع ساعات
1	2,5	بعد تناول
إلى 1,2	أو أكثر	وجبة غذائية

عندما يدخل الدم إلى الكبد بتحلون مرتفع ، تمتص الخلايا الكبدية الكليكوز الفائض و تفرز أنزيم تركيب الغليكوجين الذي تقوم بدمج الغليكوز الممتص في جزيئة الغليكوجين ، تسمى هذه العملية بالجليكوجينيز ، و تتم حسب التفاعل التالي :



عندما يدخل الدم إلى الكبد بتحلون منخفض ، تفرز الخلايا الكبدية أنزيم الفوسفوريلاز الذي يقوم بتفكيك الغليكوجين الكبدي و تحرير الغليكوز الذي يعود إلى الدم لرفع التحلون ، تسمى هذه العملية بالجليكوجينوليز و تتم حسب التفاعل التالي :



**5- هل الكبد وحده كاف لتنظيم تحلون الدم؟**

أ- ملاحظة :

عادة يظهر داء السكري عند البالغين ، لكن هناك نوع من داء السكري يظهر عند الأطفال ، الفحص الدقيق لهؤلاء الأطفال يظهر نشاطا طبيعيا للكبد ، لكن على مستوى البنكرياس نجد مناطق خلاياها مدمرة بسبب غزو من طرف الكريات اللمفاوية المناعية التي تهدم هذه الخلايا .

ب-فرضية :


ربما البنكرياس يساهم في تنظيم تحلون الدم



ت- تجربة :

عند كلب سليم تم استئصال البنكرياس و تتبع تحلون الدم

ث- نتيجة :




يؤدي استئصال البنكرياس إلى ارتفاع تحلون الدم .

ج- استنتاج :

الكبد وحده غير كاف لتنظيم تحلون الدم ، لا بد من وجود بنكرياس سليم .


6- كيف ساهم البنكرياس في تنظيم تحلون الدم ؟ :

أ- تجربة :



عند الكلب مستأصل البنكرياس ، نصل البنكرياس بالوريد الوداجي ، و نتبع تطور تحلون دمه .

ب-نتيجة :




يؤدي وصل البنكرياس إلى عودة  
التحلون إلى القيمة الطبيعية ،  
إزالة البكرياس تعيد ارتفاع تحلون  
الدم .

وصل  
البنكرياس


إزالة  
البنكرياس

ت-استنتاج :

يساهم البنكرياس في تنظيم تحلون الدم عن طريق مواد يطرحها في الدم  
تحليل الدم الخارج من البنكرياس كشف عن وجود نوعين من عديدات الببتيد الأنسولين و  
الجليكاكون .




بنية الجليكاغون



بنية الأنسولين

### ث-بنية البنكرياس :

تظهر الملاحظة المجهرية للبنكرياس نوعين من الأنسجة :




ملاحظة مجهرية للبنكرياس



موقع البنكرياس في الجسم

- نسيج a يمثل العنيدات البنكرياسية ، وهي عبارة عن مجموعات من الخلايا الإفرازية المفرزة لأنزيمات العصارة الهضمية البنكرياسية ، تصب إفرازاتها في القناة البنكرياسية فتوصلها إلى المعوي الدقيق حيث تقوم بوظيفة الهضم
- نسيج b يضم مجموعة من الخلايا الدقيقة التي تكون جزيرات لونغرانس، هذه الخلايا مسؤولة عن إفراز الأنسولين و الغليكاكون

تصل إفرازات العنيدات إلى المعوي الدقيق لتساهم في وظيفة الهضم و تصل إفرازات جزيرات لونغرانس إلى الدم لتساهم في تنظيم تحلون الدم فالبنكرياس غدة مختلطة خارجية الإفراز و داخلية الإفراز








رصد جزيرات لونجرانس بمضادات الأجسام المتفلورة و الموجهة ضد الأنسولين و الغليكاكون يظهر خلايا مختصة في إفراز الأنسولين و تسمى الخلايا  $\beta$

و خلايا مختصة في إفراز الغليكاكون و تسمى الخلايا  $\alpha$ .

رسم تخطيطي لبنية البنكرياس:





## 7- دور الأنسولين و الغليكاكون :

أ- الكشف عنه : تحليل واثاق :

في غياب الغليكوز يكون الأنسولين  
منعدما و يكون الغليكاكون في أعلى  
قيمة له .


حتى التحلون الطبيعي يكون الأنسولين  
غائبا و تبدأ كمية الغليكاكون في الانخفاض  
بعد تجاوز التحلون الطبيعي يظهر الأنسولين  
و يبدأ في الارتفاع ، في حين يواصل  
الغليكاكون انخفاضه و يصبح منعدما ابتداء  
من تركيز 3 g/l



عند الشخص السليم تكون نسبة  
الأنسولين و الغليكاكون مستقرة في  
قيمة ثابتة .

يؤدي تناول الكليكوز إلى ارتفاع تحلون  
الدم فترتفع نسبة الأنسولين و تنخفض  
نسبة الغليكاكون.

يؤدي ارتفاع نسبة الأنسولين إلى  
تخفيض تحلون الدم فيعود إلى القيمة  
الطبيعية ، عندها تعود نسبة الأنسولين  
و الغليكاكون إلى قيمتهما الأصلية .



يؤدي حقن الأنسولين إلى ارتفاع نسبة الغليكوجين الكبدية ، و يؤدي حقن الغليكاغون إلى تخفيض نسبة الغليكوجين الكبدية و إلى رفع تحلون الدم .

ث- استنتاج :

يفرز البنكرياس الأنسولين و الغليكاغون و يلقي بهما في الدم ليؤثرا على نشاط الكبد لتنظيم تحلون الدم ، تسمى المواد التي يفرزها عضو ، وينقلها الدم لتؤثر على عضو آخر هرمونات ، و تسمى الأعضاء المنتجة للهرمونات بالغدد الصماء

الغليكاغون	الأنسولين			الهرمون
الخلايا الكبدية	باقي خلايا الجسم	خلايا ودكية	خلايا عضلية	الخلايا الكبدية
الغليكوجين و طرح الكليكويز	امتصاص الكليكويز و تنشيط استهلاكه	امتصاص الكليكويز و تحويله إلى دهون	امتصاص الكليكويز و تحويله إلى غليكوجين	الغليكوجين

الأنسولين هرمون مخفض لتحلون الدم يرفع نفاذية بعض أنواع خلايا الجسم للغليكويز فتمتصه و يحث الخلايا الكبدية على إنتاج أنزيم الغليكوجين سنتتاز لتركيب الغليكوجين .

الغليكاغون هرمون رافع لتحلون الدم يحث الخلايا الكبدية على تركيب الفوسفوريلاز و تفكيك الغليكوجين .




## ج- ملحوظة :

- بالإضافة إلى الغليكاغون يوجد في الجسم عدة هرمونات رافعة لتحلون الدم كوظيفة ثانوية مثل الأدرنالين و الكورتزول ، في حين تنفرد الأنسولين بدورها كمخفض لتحلون الدم .
- يوجد في الجسم عدة غدد صماء تلقي بهرموناتها في الدم لينقلها إلى الخلايا الهدف دون أي خطأ ، فالهرمونات نوعية .

## 8- نوعية الهرمونات :

ترجع نوعية الهرمونات إلى امتلاك خلاياها الهدف لمستقبلات غشوية سطحية متكاملة الهيئة مع الهرمون ، عندما يصادف الهرمون مستقبله و 4 ص 81



- يتحد الهرمون مع مستقبل عن طريق التكامل ، تسمى هذه المرحلة استقبال الرسالة.
- يؤدي هذا الاتحاد إلى تنشيط أنزيم غشوي للخلية الهدف يسمى أدنيل سيكلاز
- يحول الأدنيل سيكلاز ATP إلى AMPc تسمى هذه المرحلة ترجمة الرسالة.
- يقوم AMPc بتنفيذ دور الهرمون داخل الخلية الهدف ، لذلك يمثل الهرمون الرسول الأول من الغدة إلى الخلية الهدف و تمثل AMPc الرسول الثاني للغدة داخل الخلية الهدف . تسمى

هذه المرحلة تنفيذ الرسالة .  
ملحوظة : الهرمونات نوعان :

- ببتيدية لها مستقبل غشوي تنفذ وظيفتها داخل الخلية عبر  $AMP_c$
- دهنية كالهرمونات الجنسية لها مستقبل سيتوبلازمي تنفذ وظيفتها مباشرة داخل النواة و لا تحتاج إلى  $AMP_c$  .

منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة

[www.svt-assilah.com](http://www.svt-assilah.com)

M.KAMMAMH